Vroege bescherming: vaccinatie in het ei

NCD

Zowel NCD- als IB-vaccinvirussen vermenigvuldigen zich in de luchtwegen.

Er wordt een interval aangeraden van minstens 14 dagen bij het toedienen van IB en NCD vaccins via de luchtwegen.

U kunt een IB vaccinatie bij eendagskuikens WEL uitvoeren kort nadat u gevaccineerd heeft met een NCD-vectorvaccin.

NCD / Gumboro / Marek / HVT

Een vectorvaccin wordt toegediend in de broederij, via in ovo-vaccinatie op dag 18 van het broedproces.

Gumboro

Aangeraden wordt om voor Gumboro een entdatumbepaling uit te voeren bij eendagskuikens.

Als uw vleeskuikenkoppel afkomstig is van meerdere moederdierenkoppels is het lastig om de juiste entdatum te bepalen.

Bij een té vroege vaccinatie wordt er geen bescherming opgebouwd tegen Gumboro.

Bij een te late vaccinatie zijn uw vleeskuikens een periode niet beschermd tegen Gumboro.

U hoeft GEEN entdatumbepaling uit te voeren als u vaccineert met een Gumboro vectorvaccin.

Marek / HVT

Marek kan ook bij vleeskuikens optreden.

Marek wordt vooral aangetroffen bij vleeskuikens die langer leven maar kan ook op jonge leeftijd voorkomen.

Marek is niet te behandelen maar kan wel preventief voorkomen worden door middel van vaccinatie.

Bij sommige vectorvaccins wordt HVT (herpesvirus bij kalkoenen) gebruikt als “ruggengraat”. HVT is een Marekvirus.

Voordelen van in ovo-vaccinatie

- Minder vaccinaties in de stal, minder arbeid voor u.
- Juiste individuele dosering per kuiken zorgt voor uniforme bescherming op koppelniveau.
- In ovo-vaccinatie zorgt voor een vroege activering van de afweer en een snelle opbouw van bescherming.
- Geen Gumboro entdatumbepaling nodig.
- In ovo-vaccinatie zorgt voor minder vaccinaties in de stal en minder stress binnen uw koppel.
- Vóór uitkomst gevaccineerd tegen NCD, Gumboro én Marek.

UIN 323296

www.my-msd-animal-health.nl

MSD Animal Health
The Science of Healthier Animals®